

DIFFÉRENCE ENTRE VIH ET SIDA

VIH :

Virus de l'immunodéficience humaine
(attaque le système immunitaire).

SIDA :

Syndrome d'immunodéficience acquise
(stade avancé de l'infection au VIH).



Réaction de l'organisme

- Le corps produit de nouvelles cellules T4 pour combattre l'infection.
- Le VIH peut être contrôlé pendant plusieurs années, mais il se multiplie très rapidement, affaiblissant progressivement le système immunitaire sans traitement.

***Sans traitement, le nombre de cellules T4 diminue et l'immunité devient de plus en plus faible.**

VIH indétectable = VIH intransmissible

Une personne vivant avec le VIH qui suit un traitement dont la charge virale est indétectable ne transmet plus le virus.

CONTACT :

010/46.06.11
NYAMPINGA@collectifdesfemmes.be

www.collectifdesfemmes.be



Collectif des
FEMMES

AVEC LE SOUTIEN DE LA WALLONIE



AVIO

PRÉVENTION, TRAITEMENT ET RÉSILIENCE DES FEMMES EN SITUATION DE PRÉCARITÉ



CIBLES DU VIH

- Le VIH attaque les cellules T4 ou CD4 (les cellules qui défendent l'organisme).
- Une fois contaminée, la cellule T4 est transformée en « usine » à fabriquer de nouveaux virus (environ 10 milliards par jour).
- Ces nouveaux virus attaquent à leur tour d'autres cellules T4.




DÉPISTAGE ET TRAITEMENTS

Traitements

- **TPE** : Traitement Post-Exposition, à prendre juste après une prise de risque pour réduire les chances d'infection.
- **PrEP** : Traitement préventif pour les personnes très exposées au VIH.
- **TasP** : Traitement des personnes séropositives pour empêcher la transmission du virus.

Dépistage

- **Prise de sang** : résultat 6 semaines après une prise de risque.
- **Test rapide (TROD)** : Résultats à 100 % fiables 3 mois après la prise de risque.
- **Autotest** : Disponible en pharmacie, à faire au moins 3 mois après l'exposition.



TRANSMISSION ET MODES DE TRANSMISSION

TRANSMISSION DU VIH

- le sang
- le sperme
- les sécrétions vaginales
- le lait maternel

MODES DE TRANSMISSION DU VIRUS VIH

- Voie sexuelle (mode principal)
- Inoculation directe de sang (seringues contaminées par ex.)
- Pendant la grossesse
- Lors de l'accouchement
- Pendant l'allaitement